CANADA AND THE RAMSAR CONVENTION

The Convention on the Conservation of Wetlands
of International Importance

Canada

91-03102/

CANADA AND THE RAMSAR CONVENTION

3 Introduction
5 Mary's Point Unit – Shepody National Wildlife Area
6 Cap Tourmente National Wildlife Area
7 Long Point National Wildlife Area
8 Last Mountain Lake Sanctuary and Wildlife Area
9 Alaksen National Wildlife Area
10 Polar Bear Pass National Wildlife Area
11 Ramsar Canada Sites

Environment Canada Environnement Canada

INTRODUCTION

Wetlands have great value as areas of very high biological productivity. This was officially acknowledged by the world when 18 countries signed the Convention on the Conservation of Wetlands of International Importance at Ramsar, Iran, in 1971. Canada became a signatory to the Ramsar Convention, as it is known, in 1981.

The designation of an area as a Ramsar site is not an attempt to prevent all environmental change. It is a way of ensuring that the potential hazards of development are thoroughly examined, and that possible remedies are fully explored and properly designed before the event, rather than having to be improvised at the construction stage.

The Convention does not override national legislation to protect wetlands, but helps to support that legislation by drawing international attention to threats of serious damage to listed wetlands. So far, no listed sites have been lost and a number have been saved, at least partially due to the strong international pressure that the Convention helps to create.

Environment Canada's Canadian Wildlife Service carries out the obligations of the Convention for Canada: to identify and to secure the designation of sites of international importance and to ensure that these are adequately protected, now and in the future. With the co-operation of provincial and territorial governments, Canada has so far designated 17 wetland areas. Several more will be added in 1987.

The majority of Canadian sites are in the North and most are very large. Large areas are often necessary in Canada because of the relatively low density of bird populations in the colder and drier northern latitudes.

Some of the designated sites seem to be free of the risk of imminent development or other man-made hazards. For these, designation as Ramsar sites is added protection, should unexpected development suddenly threaten. Other sites, most notably Mary's Point at the upper end of the Bay of Fundy, are potentially liable to massive change by projected development — in the case of Mary's Point, a tidal power scheme.

Other coastal sites in the south — Cap Tourmente National Wildlife Area (NWA) in Quebec, Long Point NWA in Ontario and Alaksen NWA in British Columbia — are also continually at risk from the hazards of pollution. However, the vulnerability of these sites increases rather than diminishes their importance, both as homes for large numbers and varieties of migratory birds and other estuarine animals and plants, and as places where the public can see and appreciate the full range of wetland values.

Since it has the longest coastline of any nation in the world and 15 per cent of the planet's fresh water, Canada not surprisingly has a vast and precious heritage of wetlands which must not be imperilled. It is, therefore, appropriate that the combined area of Canadian Ramsar sites exceeds the total area of all the sites so far designated by the other signatories to the Wetlands Convention. Though there may not be many more large areas to be designated as Ramsar sites, the Canadian Wildlife Service looks forward to the addition of more provincially-nominated and -controlled sites, as well as more sites on federal Crown land.

Yet, there is little point in taking expensive measures to conserve wetlands in Canada if the wetlands in other countries that sustain Canadian birds for more than half the year deteriorate to the point where they are unable to support migrants from North America. So, we must also be concerned about what is happening to wetlands in the Caribbean, Central and South America, and those parts of western Europe, northern Africa and eastern Asia that share North America's birds. Canada is encouraging other Western Hemisphere nations to sign the Ramsar Convention.

Ramsar sites in Canada are protected by legislation — the Canada Wildlife Act and Wildlife Area Regulations; the Migratory Birds Convention Act and Migratory Bird Sanctuary Regulations; and, where appropriate, provincial and territorial acts and regulations.

Canada will host the next meeting of the parties to the Convention in Regina in June, 1987.

Designated Ramsar site in 1982

MARY'S POINT UNIT
SHEPODY NATIONAL WILDLIFE AREA

One of eastern North America's most important resting and feeding areas for shorebirds is found at the head of the Bay of Fundy in New Brunswick. Mary's Point, a unique section of the Bay of Fundy shoreline, is located 40 kilometers south of Moncton. The Shepody National Wildlife Area at Mary's Point covers an area of 1,200 hectares and includes a large tidal marsh, expanses of inter-tidal mudflats and a peninsula which protrudes into Shepody Bay.

The broad mudflats and gravel beach of Mary's Point attract more migrating shorebirds than any other single place in North America. Several million Semi-palmated Sandpipers feed and roost in the area from late July to early September, along with thousands of Least Sandpipers, Short-billed Dowitchers, Black-bellied Plovers, Red Knots and several other species of shorebirds. These birds are attracted to the area by the presence of an amphipod crustacean, the *Corophium volutator*, on which they feed. A relative of the shrimp and the sand flea, the amphipod is found in North America only in the Bay of Fundy, where it occurs in densities that are the highest in the world. Several species of ducks, Canada Geese and other waterfowl also frequent the Shepody National Wildlife Area.

Designated Ramsar Site in 1981

CAP TOURMENTE NATIONAL WILDLIFE AREA

The 2,200 hectares of tidal marsh and wet meadow just upstream of Cap Tourmente, 50 kilometers northeast of Quebec City, are famous as the principal migratory staging area, in spring and fall, of the Greater Snow Goose.

The Greater Snow Goose breeds in the eastern high Arctic islands of Canada, and winters on the coastal marshes of the U.S. Atlantic coast from New Jersey to North Carolina. The Greater Snow Goose declined in number to as few as 3,000 in the early years of the Twentieth Century. Now, however, they exceed 300,000 prior to their fall migration, thanks largely to the effective protection of the geese and their critical habitats.

Cap Tourmente National Wildlife Area was in private hands until purchased by the Government of Canada in 1972. It has since become a major attraction for naturalists, not only because of the geese, but also for its wide variety of fauna and flora, and for its great scenic beauty.

Designated Ramsar site in 1982

LONG POINT NATIONAL WILDLIFE AREA



Long Point is the longest and, in many ways, the most unusual of the three peninsulas that jut out into Lake Erie from its Ontario shore. Wildlife is abundant and remarkably diverse in the area. Rare and uncommon species of plants, mammals, reptiles and amphibians can be found at Long Point, which is located 15 kilometers southeast of Port Rowan, Ontario, and occupies an area of 13,730 hectares.

Extending towards Lake Erie's southeastern shore, Long Point serves as a "funnel" for migrating birds, and provides them with an important resting place. It is renowned for the abundance and diversity of the waterfowl it supports during spring and fall migrations. Up to 30,000 Tundra Swans pass through Long Point marshes in the spring. During spring and fall migration significant portions of the North American populations of Redhead, Canvasback and many other species of ducks concentrate in this area. Migration studies on territorial birds, done by members of the Long Point Bird Observatory now provide an important means of monitoring population changes among boreal species.

Long Point is important as one of the few undisturbed refuges for amphibian and reptile species in southern Canada. Six species of turtles nest on Long Point, three of which are considered rare in Ontario and Canada: the Spotted, Blanding's and the Eastern Spiny Soft-shelled. The Eastern Fox Snake, a threatened species whose range is limited and diminishing in southwestern Ontario, is found in the area.

Designated Ramsar site in 1982

LAST MOUNTAIN LAKE SANCTUARY AND WILDLIFE AREA

Last Mountain Lake, established in 1887, is the oldest waterfowl refuge in North America. It is located 150 kilometers southeast of Saskatoon and occupies an area of 15,600 hectares.

The area, situated at the north end of Last Mountain Lake, consists of a series of shallow marshy bays, inlets and wet fields which border the lake. It supports, particularly during the fall, hundreds of thousands of migrating waterfowl, especially Lesser Snow and White-fronted Geese, Sandhill Cranes, many species of ducks and a variety of shorebirds. The endangered Whooping Crane has been sighted regularly during spring and fall migrations. The endangered Piping Plover has bred along the lake shore.

Colonial nesting birds which breed on the islands and marshes include Common and Caspian Terns, the Double-crested Cormorant, Western Grebe, Franklin's, Ring-billed and California Gulls. Large numbers of White Pelicans use the area each summer. Although between 1956 and 1983 the pelicans nested only once in the area, they began nesting again in 1984 and 1985.

Designated Ramsar site in 1982

ALAKSEN NATIONAL WILDLIFE AREA



British Columbia's Fraser River estuary is the most important stretch of shoreline for wildlife, particularly birds, on Canada's west coast. It is used by large numbers of birds as a migration stop-over or wintering area. Alaksen National Wildlife area, 35 kilometers south of Vancouver, plays a key role in the protection of the Fraser estuary. Although the Alaksen area itself consists of only 300 hectares of upland, it controls access to a large inter-tidal zone which is protected as a provincial game sanctuary.

Up to 30,000 of the Lesser Snow Geese that breed on Wrangel Island, east of Siberia, roost and feed on the estuary for much of the winter. During high tides or periods of bad weather most of these geese can be found on the uplands of Alaksen. In addition, 10,000 to 20,000 dabbling ducks, mainly American Wigeon, use the protected area, along with about 2,000 Canada Geese, which are mostly the progeny of recently-reintroduced birds. Shorebirds are present at various times of the year in much larger numbers, although most one-day bird counts tend to underestimate greatly the number of shorebirds visiting the site.

Designated Ramsar site in 1982

POLAR BEAR PASS NATIONAL WILDLIFE AREA



Polar Bear Pass is Canada's northernmost and largest National Wildlife Area. Located on Bathurst Island adjacent to the Northwest Passage, it occupies an area of 2,624 square kilometers. Polar Bear Pass is a wetland oasis in the surprisingly dry high Arctic. It provides an abundance of ponds and wetlands that support a bird population which is uniquely diversified for a site as far north as 73 degrees of latitude.

Migratory birds from both North American and Europe breed in Polar Bear Pass; many of them at the northern limits of their range. The area is important for the populations of King Eiders, Greater Snow Geese, gulls, jaegers and shorebirds it supports. Atlantic Brant that nest in Polar Bear Pass migrate through Iceland to winter in Ireland.

The area also provides habitat for muskoxen and Peary caribou, the latter a threatened species. The adjacent coastal waters are important to marine mammals and waterfowl, staging for their fall migration. Polar bears migrate through the pass during summer and walrus use several "haul out" areas along the Brooman Peninsula.

RAMSAR CANADA SITES



1 Mary's Point (N.B.)
2 Chignecto NWA (N.S.)
3 Cap Tourmente NWA (Que.)
4 Long Point NWA (Ont.)
5 St. Clair NWA (Ont.)
6 Delta Marsh (Man.)
7 Last Mountain Lake (Sask.)
8 Peace-Athabasca Delta (Alta.)
9 Hay Zama Lakes (Alta.)
10 Alaksen NWA (B.C.)
11 Old Crow Flats (Yukon)
12 Whooping Crane Summer Range (Alta., N.W.T.)
13 Queen Maud Gulf MBS (N.W.T.)
14 Rasmussen Lowlands (N.W.T.)
15 Polar Bear Pass NWA (N.W.T.)
16 Dewey Soper MBS (N.W.T.)
17 McConnell River MBS (N.W.T.)

Wildlife '87: Gaining Momentum is the theme for special recognition being given to wildlife conservation in Canada. Environment Minister Tom McMillan officially designated 1987 as a year of wildlife conservation. It also marks the 100-year anniversary of the establishment of Canada's first migratory bird sanctuary, at Last Mountain Lake, Saskatchewan. The logo, featuring the whooping crane, has been formally adopted as symbolic of the many accomplishments and continuing efforts for wildlife in Canada and internationally.

Further information and additional copies of this brochure are available from:

Habitat Program
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, Canada
K1A 0E7

CANADA CONFERENCE 1987

Issued under the authority of the Minister of the Environment

©Minister of Supply and Services Canada 1987
Cat. No. CW66-84/1987
ISBN 0-662-54973-2

LE CANADA ET LA CONVENTION DE RAMSAR



Convention relative à la conservation des zones humides d'importance internationale

Canada

LE CANADA ET LA CONVENTION DE RAMSAR

3 Introduction

5 Section de la pointe Mary – Réserve nationale de faune de Shepody

6 Réserve nationale de faune du cap-Tourmente

7 Réserve nationale de faune de Long Point

8 Réserve de faune du lac de la Dernière-Montagne

9 Réserve nationale de faune d'Alaksen

10 Réserve nationale de faune du col Polar Bear

11 Sites Ramsar au Canada

Environnement Canada Environment Canada

INTRODUCTION

Les terres humides ont une grande valeur en raison de leur productivité biologique très élevée, et ce fait a été officiellement reconnu à l'échelle internationale lorsque 18 pays ont signé en 1971 à Ramsar, Iran, la Convention relative à la conservation des zones humides d'importance internationale. Comme on le sait, le Canada est devenu l'un des signataires de la Convention en 1981.

La désignation d'un site Ramsar n'équivaut pas à une tentative visant à prévenir tout changement environnemental. Il s'agit d'assurer que les dangers potentiels de tout aménagement sont soigneusement examinés et que des mesures correctrices sont étudiées en profondeur et préparées à l'avance plutôt que d'improviser à l'étape de la construction.

La Convention n'a pas la priorité sur les lois nationales de protection des terres humides, mais elle vient les appuyer en attirant l'attention du monde entier sur les menaces ou les graves dangers dont les terres inscrites sur la liste peuvent faire l'objet. Jusqu'à présent, aucun de ces sites n'a été perdu et un certain nombre ont été préservés, en partie du moins à cause de la forte pression internationale que la Convention a aidé à créer.

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada s'acquitte des obligations que le Canada a contractées en signant la Convention. Il s'occupe de faire désigner des sites d'importance internationale et s'assure que ces sites sont et seront convenablement protégés. Avec la collaboration des gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement du Canada a désigné jusqu'ici 17 zones humides, auxquelles plusieurs autres viendront s'ajouter en 1987.

La majorité des sites canadiens se trouvent dans le Nord et sont très vastes. Au Canada, de grands territoires sont souvent nécessaires parce que dans les régions nordiques, qui sont froides et sèches, la densité des populations d'oiseaux est relativement faible.

Certains sites désignés ne semblent pas menacés par un aménagement imminent ou d'autres dangers d'origine humaine. Leur désignation constitue une protection accrue contre la menace soudaine d'un aménagement imprévu. D'autres sites peuvent être sujets à des changements considérables causés par des aménagements prévus; il s'agit notamment de la pointe Mary, à l'extrémité nord de la baie de Fundy, où l'énergie marémotrice sera exploitée.

Dans le sud du pays, d'autres sites au bord de l'eau, comme la réserve nationale de faune du cap-Tourmente, au Québec, la réserve nationale de faune de Long Point, en Ontario, et la réserve nationale de faune d'Alaksen, en Colombie-Britannique, sont continuellement menacés par la pollution. Toutefois, la vulnérabilité de ces sites a pour effet d'augmenter plutôt que de diminuer leur importance, car un grand nombre et une grande variété d'oiseaux migrateurs et d'autres animaux et plantes estuariens y vivent, et c'est là que le public peut voir et apprécier toute la valeur des terres humides.

Étant donné que le Canada possède le plus long littoral au monde et que 15 pour cent de toute l'eau douce de la planète se trouve sur son territoire, il n'est pas surprenant que ses terres humides constituent pour lui un vaste et précieux patrimoine qui ne doit pas être mis en danger. Ce n'est donc pas sans raison que la superficie totale des sites Ramsar canadiens soit supérieure à la superficie globale de tous les sites désignés jusqu'à présent par les autres signataires de la Convention. Il ne reste peut-être plus beaucoup de vastes étendues à désigner comme sites Ramsar, mais le Service canadien de la faune envisage d'ajouter plus de sites mis en candidature et contrôlés par les provinces ainsi que d'autres zones se trouvant sur les terres de la Couronne fédérale.

Par ailleurs, il est inutile de dépenser beaucoup d'argent pour conserver les terres humides du Canada si, dans d'autres pays, les zones humides qui permettent aux oiseaux canadiens de vivre pendant plus de six mois se détériorent à un point tel qu'elles ne peuvent plus accueillir les migrants de l'Amérique du Nord. Nous devons donc également nous intéresser au sort des terres humides des Antilles, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud ainsi que des régions de l'Europe de l'Ouest, de l'Afrique du Nord et de l'est de l'Asie que fréquentent les oiseaux de l'Amérique du Nord. Le Canada encourage d'autres pays de l'hémisphère occidental à signer la Convention de Ramsar.

Au Canada, les sites Ramsar sont protégés par la Loi sur la faune du Canada et le Règlement sur les réserves de faune, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et le Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs ainsi que les lois et règlements provinciaux et territoriaux, lorsqu'ils s'appliquent.

Le Canada sera l'hôte de la prochaine réunion des signataires de la Convention, qui aura lieu à Regina en juin 1987.

Protégée en vertu de la Convention de Ramsar depuis 1982

SECTION DE LA POINTE MARY RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DE SHEPODY

Une des aires de repos et d'alimentation les plus importantes pour les oiseaux de rivage de l'est de l'Amérique du Nord se trouve à l'extrémité nord de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. La pointe Mary, un élément unique du littoral de cette baie, est située à 40 km au sud de Moncton. La réserve nationale de faune de Shepody à la pointe Mary couvre une superficie de 1200 hectares et comprend un vaste marais, des étendues de laisses de vase intertidales et une péninsule s'avançant dans la baie de Shepody.

Les larges laisses de vase et les plages de gravier de la pointe Mary attirent plus d'oiseaux migrateurs que dans n'importe lequel autre endroit en Amérique du Nord. Plusieurs millions de bécasseaux semi-palmés viennent s'y nourrir et s'y nicher de la fin juillet à la fin septembre. Il y a également des milliers de bécasseaux minuscules, de bécasseaux roux, de pluviers à ventre noir, de bécasseaux à poitrine rousse et plusieurs autres espèces d'oiseaux de rivage. C'est un petit amphipode (*Corophium volutator*) qui attire tous ces oiseaux dans cette région. De la même famille que la crevette et la puce de mer, cet amphipode ne se trouve uniquement que dans la baie de Fundy, là où sa densité est la plus élevée au monde. Plusieurs espèces de canards, des bernaches et d'autres oiseaux aquatiques fréquentent aussi la réserve de Shepody.

Protégée en vertu de la Convention de Ramsar depuis 1981

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP-TOURMENTE

Les 2200 hectares de battures et de prairies inondées juste en amont du cap-Tourmente, à 50 km au nord-est de la ville de Québec, sont célèbres parce qu'ils servent de principale halte migratoire automnale et printanière des grandes oies blanches.

Les grandes oies blanches vont se reproduire dans les îles de l'Extrême-Arctique à l'est du Canada et hivernent dans les marais côtiers de la côte atlantique des États-Unis, du New Jersey à la Caroline du Nord. Au début du XX^{e} siècle, il ne restait plus que 3000 grandes oies blanches. Maintenant, leur population compte plus de 300 000 individus avant leur migration automnale, et ce, grâce aux efforts de protection des oies et de leurs habitats.

Jusqu'à son acquisition par le gouvernement du Canada en 1972, la réserve du cap-Tourmente était entre les mains d'un propriétaire privé. Elle est depuis devenue un des plus grands centres d'attraction des naturalistes, non seulement à cause des oies, mais aussi en raison de la grande diversité de faune et de flore et de la beauté des paysages.

Protégée en vertu de la Convention de Ramsar depuis 1982

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DE LONG POINT

Long Point est la plus longue et, à bien des égards, la plus insolite des trois péninsules qui s'avancent de la rive ontarienne du lac Érié. Cette région abrite une faune abondante et très variée. On y retrouve des espèces rares ou peu communes de plantes, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens. Long Point se trouve à 15 kilomètres au sud-est de la ville de Port Rowan et couvre une superficie de 13 730 hectares.

S'étendant jusqu'à la rive sud-est du lac Érié, Long Point forme une sorte d'entonnoir, lequel constitue une aire de repos importante pour les oiseaux migrateurs. Cet endroit est renommé pour l'abondance et la variété d'oiseaux aquatiques qu'il abrite pendant les migrations d'automne et de printemps. Jusqu'à 30 000 cygnes siffleurs traversent les marais de Long Point au printemps. Durant les migrations automnales et printanières, une grande partie des populations nord-américaines de morillons à tête rouge, de morillons à dos blanc et de bien d'autres espèces de canards s'y regroupent. Les études effectuées par les membres de l'observatoire d'oiseaux de Long Point permettent de suivre de près les changements intervenant dans les populations des espèces boréales.

Long Point est importante parce qu'elle est un des rares refuges demeurés intouchés des espèces d'amphibiens et de reptiles du sud du Canada. Six espèces de tortue nichent à Long Point, dont trois d'entre elles, la tortue ponctuée, la tortue mouchetée et la tortue molle à épines de l'Est, sont considérées rares en Ontario et dans le reste du Canada. La couleuvre fauve de l'Est, une espèce menacée dont l'aire de distribution est limitée au sud-ouest de l'Ontario, se retrouve également dans cette région.

Protégée en vertu de la Convention de Ramsar depuis 1982

RÉSERVE DE FAUNE DU LAC DE LA DERNIÈRE-MONTAGNE

Établi en 1887, le refuge d'oiseaux aquatiques du lac de la Dernière-Montagne est le plus ancien de l'Amérique du Nord. Il est situé à 150 kilomètres au sud-est de Saskatoon et couvre une superficie de 15 600 hectares.

Situé à l'extrémité nord du lac de la Dernière-Montagne, ce site comprend des baies marécageuses peu profondes, des criques et des champs inondés qui ceinturent le lac. En automne particulièrement, il accueille des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs, tels que la petite oie blanche, l'oie à front blanc, la grue canadienne, ainsi que de nombreuses espèces de canards et une variété d'oiseaux de rivage. La grue blanche d'Amérique, une espèce menacée, y a également été observée régulièrement durant les migrations d'automne et de printemps. Le pluvier siffleur, une autre espèce menacée, niche à plusieurs endroits le long de la rive du lac.

Il y aussi les espèces d'oiseaux vivant en colonies, qui viennent nicher dans les îles et les marais de cette région : la sterne commune et la sterne caspienne, le cormoran à aigrettes, le grèbe de l'Ouest, la mouette de Franklin, le goéland à bec cerclé et le goéland de Californie. De nombreux pélicans blancs reviennent chaque été. Entre 1956 et 1983, les pélicans n'ont niché qu'une seule fois dans la région et en 1984 et en 1985, ils sont revenus y nidifier.

Protégée en vertu de la Convention de Ramsar depuis 1982

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE D'ALAKSEN



L'estuaire du Fraser en Colombie-Britannique est la portion du littoral la plus importante pour la sauvagine de la côte ouest. Les oiseaux utilisent ce site comme halte migratoire ou pour y hiverner. La réserve nationale de faune d'Alaksen, à 35 kilomètres au sud de Vancouver, est essentielle à la protection de l'estuaire. Bien qu'elle couvre seulement 300 hectares de hautes terres, la réserve contrôle l'accès à une large zone intertidale protégée comme refuge provincial de gibier.

Jusqu'à 30 000 petites oies blanches nichant dans l'île Wrangel, à l'est de la Sibérie, viennent s'alimenter et percher dans l'estuaire pendant une grande partie de l'hiver. Pendant les hautes marées ou les périodes de mauvais temps, la plupart des oies se réfugient dans les hautes terres d'Alaksen. De 10 000 à 20 000 canards barboteurs, essentiellement des canards siffleurs d'Amérique, et environ 2000 bernaches canadiennes (dont la plupart sont les descendants d'oiseaux récemment réintroduits) utilisent aussi cette région protégée. À certaines périodes de l'année, on peut y observer un plus grand nombre d'oiseaux de rivage.

Protégée en vertu de la Convention de Ramsar depuis 1982

RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU COL POLAR BEAR

La réserve nationale de faune du col Polar Bear est la plus septentrionale et la plus grande du Canada. Située dans l'île de Bathurst, le long du passage du Nord-Ouest, elle s'étend sur une surface de 2624 kilomètres carrés. Cet oasis marécageux dans l'Extrême-Arctique très sec recèle une multitude d'étangs et de terres humides abritant une population d'oiseaux d'une diversité unique pour un site au 73° de latitude Nord.

Les populations nord-américaines et européennes d'oiseaux migrateurs viennent se reproduire au col Polar Bear qui, pour plusieurs d'entre elles, se trouve à la limite nord de leur aire de distribution. Cette région est importante pour les populations d'eiders remarquables, de grandes oies blanches, de goélands, de labbes et d'oiseaux de rivage qu'elle abrite. Au cours de leurs migrations, les bernaches cravants qui nichent au col Polar Bear traversent l'Islande pour aller hiverner en Irlande.

Cette région est également l'habitat de boeufs musqués et de caribous de Peary, ces derniers étant une espèce menacée. Les eaux côtières adjacentes sont importantes pour les mammifères marins et constituent une halte migratoire et de repos pour la sauvagine. En été, le col est le lieu de migration des ours blancs, et les morses viennent se creuser des abris à plusieurs endroits le long de la péninsule de Brooman.

SITES RAMSAR AU CANADA

1 Pointe Mary (N.-B.)
2 RNF Chignecto (N.-É.)
3 RNF Cap-Tourmente (Qué.)
4 RNF Long Point (Ont.)
5 RNF Saint-Clair (Ont.)
6 Delta Marsh (Man.)
7 Lac de la Dernière-Montagne (Sask.)
8 Delta des rivières Peace et Athabasca (Alb.)
9 Lacs Hay-Zama (Alb.)
10 RNF Alaksen (C.-B.)
11 Plaines Old Crow (Yukon)
12 Aire d'été de la grue blanche d'Amérique (Alb. et T.N.-O.)
13 ROM Golfe Reine-Maud (T.N.-O.)
14 Basses terres de Rasmussen (T.N.-O.)
15 RNF Col Polar Bear (T.N.-O.)
16 ROM Dewey Soper (T.N.-O.)
17 ROM Rivière McConnell (T.N.-O.)

Faune 87 : Un nouvel essor est le thème choisi pour souligner l'importance de la conservation de la faune au Canada. Le ministre de l'Environnement Tom McMillan a proclamé 1987, année de la conservation de la faune. Cette année marque également le centenaire de la création du premier refuge d'oiseaux migrateurs, situé au lac de la Dernière-Montagne en Saskatchewan. Le logo, illustrant deux grues blanches d'Amérique, symbolise les diverses réalisations et les efforts déployés pour protéger la faune au Canada et dans le monde entier.

Pour obtenir d'autres exemplaires et plus de renseignements, s'adresser à :

Programme des habitats
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa, Canada
K1A 0E7

RAMSAR
CANADA CONFERENCE 1987

Publié avec l'autorisation du ministre de l'Environnement

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1987
N° de catalogue CW66-84/1987
ISBN 0-662-54973-2